



Mariposas

Nuestros Lepidopteros Bonaerenses

por
Ezequiel
Núñez Bustos

Battus polydamas / Foto Ezequiel Núñez Bustos

Mariposas diurnas

Familia Papilionidae
Subfamilia Papilioninae

Borde de Oro:

Battus polydamas polydamas
(Linnaeus, 1758)

Descripción:

Adulto:
65-85 mm. Alas anteriores negras con orlas amarillas. Hilera de manchas amarillas en "V" que continúan en alas posteriores. Margen festoneado. Faz ventral más clara con alas posteriores con manchas submarginales rojas. Hembra mayor.

Huevo:
Esférico, rojizo y verrugoso, puesto individualmente o en grupos.

Oruga:
60 mm. Variable según el área. Pardo rojiza oscura con líneas oblicuas negras, tubérculos rojos y osmeterio anaranjado. Son gregarias.

Crisálida:
30 mm. Parda o verdosa, cingulada.

Conducta:

Posee un vuelo potente y veloz, con frecuentes planeos. Posa a menudo en flores diversas (mayormente en aquellas de color rojo o afines), no dejando de batir las alas (tremular) mientras absorbe néctar de las corolas. No es raro verla posada en suelos húmedos absorbiendo sales minerales disueltas. Posiblemente en la latitud de Buenos Aires existan 2 generaciones anuales.

Biología:

La oruga se alimenta en Buenos Aires de Patito (*Aristolochia fimbriata*), Mil Hombres (*A. triangularis*), Lengua (*A. lingua*), etc.

Distribución y ambientes:

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. [Sur de EEUU a Uruguay]. Se la halla tanto en áreas urbanas como silvestres desde la primavera al otoño. En la provincia de Buenos Aires se halla en la Reserva de Uso Múltiple Isla Martín García, la Reserva Integral de Punta Lara, la Reserva Natural isla Botija y en toda el área norte de la provincia.



Automeris naranja

Observaciones:

Es el miembro de la familia más común en Buenos Aires en la actualidad, hecho que parece antes no era así pues según la bibliografía era escasa y hasta no hace muchos años atrás la Limonera Grande (*Heraclides thoas thoantiades*) era la especie de la familia más representativa en la provincia.

Polillas

Familia Saturniidae
Subfamilia Hemileucinae



Oruga *Automeris naranja*

Polilla Pavo Real:

Automeris naranja Schaus, 1898

Descripción:

Adulto:
50-70 mm. Antenas plumosas. Alas anteriores pardo grisáceas con una línea clara transversal. Alas posteriores negruzcas con un área naranja dentro de la cual existe un ocelo espolvoreado de puntos blanco grisáceos y una línea tenue blanquecina. La faz ventral es pálida. Hembra mayor (con antenas menos plumosas) y algo más oscura..

Huevo:
Son puestos sobre ramitas en grupos recubiertos de pelos del abdomen de la hembra. Son achatados y blanquecinos.

Oruga:
60 mm. Del todo desarrollada es verde con manchas laterales blanco plateadas y largos pelos dorsales urticantes. Al tocarlas suelen enrollarse y tirarse al suelo.

Pupa:
Pardo rojiza. Se forma dentro de pedazos de hoja, por lo que no se ve normalmente.

Conducta:

El adulto no se alimenta y vuela durante la primavera y el verano. Acude a los focos de luz durante las noches cálidas. Normalmente se posan con las alas posteriores ocultas dado su colorido de alas anteriores crípticas. Al tocarlos suelen tirarse al suelo mostrando los ocelos como conducta disuasiva. Posiblemente existan 2 generaciones anuales.

Biología:

La oruga se alimenta de una amplia variedad de plantas, en su mayoría árboles exóticos: Ligustrina (*Ligustrum sinense*), Fresno (*Fraxinus pensylvanica*), Mora Blanca (*Morus alba*), Platanio (*Platanus occidentalis*), Madreperela (*Lonicera* sp.) y algunos nativos: Espinillo (*Acacia caven*) y Yerba Mate (*Ilex paraguariensis*). Cuando la oruga ya está lista para convertirse en pupa, une varios pedazos de hoja entre sí y se refugia dentro hasta la llegada de la época cálida.

Distribución y ambientes:

Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe [Brasil, Paraguay y Uruguay]. Se la halla tanto en áreas urbanas como silvestres desde la primavera al otoño. En la provincia de Buenos Aires se halla en la Reserva de Uso Múltiple Isla Martín García, la Reserva Integral de Punta Lara, la Reserva Natural Isla Botija y en toda el área norte de la provincia.

Observaciones:

Actualmente es la especie del género más común en la provincia. Esto contrasta con el pasado, en el cual solo volaba en el nordeste del país y era desconocida en Buenos Aires, donde era reemplazada por otra especie, hoy muy escasa (*Automeris coresus*). Hoy la encontramos siendo abundante en las ciudades, debido a que las orugas son polífagas. Suele acudir a los focos de luz durante la primavera. Las orugas poseen pelos urticantes y pueden ser abundantes ciertos años en algunas plantas, por lo que debe tenerse precaución al manipular esas plantas en época estival.



Oruga *Battus polydamas*

Fotos Ezequiel Núñez Bustos