

Aves

EL CHORORÓ

FAMILIA THAMNOPHILIDAE



Por
Martín R. de la Peña

Aves de pico fuerte. Alas cortas.
Algunas especies con la cola larga
y redondeada, en otras es muy
corta.

Se alimentan de hormigas, termitas
y de otros insectos.

Construyen el nido en los arbustos,
árboles, enredaderas, matorrales.

Ponen de 2 a 3 huevos.

Generalmente existe diferencia
de color entre ambos sexos.

Frecuentan la vegetación densa
de montes, bosques y selvas.

Chororó. *Taraba major*

Otros nombres:
Batará blanquinegro.
Batará grande.
Batará mayor.
Tiodoro.

Taraba major.
Esperanza.Santa Fe. 29-12-05.
4 días



Descripción:

Largo : 20 cm.

Macho. Dorso negro.

Ventral blanco. Alas pardas con banda blanca en las cubiertas.

Cola negra con barras blancas.

Hembra. Dorso, alas y cola, castaños. Ventralmente blanquecina.

Comportamiento:

Andan en general en parejas.

Relativamente confiados.

Recolecta alimentos en el suelo

y en follaje hasta los 2 m. de altura.

Se lo observó alimentándose de huevos de Torcaza (*Zenaida auriculata*), insectos y carne.

La vocalización es muy variada, su voz que emite con frecuencia

es un estridente Cherrrrrrrrr...

Cherrrrhh...

Habitat:

Bosques, sabanas, matorrales, claros en selvas.



Taraba major.
Macho.

Taraba major.
Hembra.



Taraba major.
Nido.



Distribución geográfica:

Taraba majormajoren el norte del país, excepto Misiones, hasta Catamarca, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Identificación en el campo :

Iris rojo. El macho, dorso negro, ventral blanco. Barras blancas en las alas y en la cola. La hembra ventralmente blanquecina, dorsalmente castaña.

Nido:

Construye el nido en arbustos, enredaderas o en matorrales, a baja altura. Tiene forma de tazón o semiesfera, colgante, atado en su borde superior a horquetas o ramitas. Emplea en la construcción fibras vegetales, tallos de yuyos. Puede ocupar el mismo nido en más de una oportunidad. Se reproduce desde Setiembre a Febrero.

Taraba major.
Nido y huevos.



Huevos:

Pone 2 ó 3 huevos, ovoidales o elípticos.

Tienen la base blanca o blanquecina con pintas y rayitas gris claro, oscuro y pardas, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Medidas: 26,1 a 30,5 x 19,2 a 22.

Taraba major.
Huevos.



Reproducción:

Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días.

El período de incubación es de 16-17 días.

Los huevos son puestos en días alternos. Los pichones nacen en 24 horas.

Permanecen en el nido 16-17 días. Ambos sexos incuban y crían a los pichones.